

A beavatkozás jellege:

A hüvelybemenet két oldalán elhelyezkedő mirigyek kivezető csövének elzáródását fájdalmas duzzanat: ciszta vagy tályog kialakulása követheti. A műtét diagnosztikus és terápiás.

A beavatkozás célja:

A tünetek, panaszok megszüntetése a tályog megnyitása, vagy a ciszta eltávolítása révén.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a duzzanatot megnyitjuk, a bennéket kiürítjük, falát a bőrhez kiöltjük, esetenként gézcsíkkal tamponáljuk. Ciszta esetében azt eltávolítjuk és szövettani feldolgozásra küldjük.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

A bemetszés helyén vérzés, vérömleny, gyulladás léphet fel.

Műtét utáni történések:

A beteg még aznap vagy másnap távozhat az osztályról.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Jelenleg nincs ilyen.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Esetleges szövettani vizsgálat leletéért 4 hét múlva jöjjön vissza, varratszedés 1 hét múlva, kontroll vizsgálat javasolt 4-6 hét múlva, addig kímélő életmód, nemi élet tilalom javasolt.

A műtét elmaradásának következményei:

A tályog spontán megreped és állandó váladékozást tart fenn.