

A beavatkozás jellege:

Urodinamiás vizsgálat javallata alapján bikini metszésből a hasfal megnyitása után a hüvelyt varratokkal felfüggesztjük a vizelettartási panaszok kezelése céljából.

A beavatkozás célja:

Vizelettartási nehézség megoldása céljából végezzük.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben hólyag katéter felhelyezése után a hasfalat megnyitjuk, a húgycső melletti és hüvelyboltozat feletti kötőszövetbe öltve a húgycsővet varratokkal megemeljük és a medencecsont csontthártyájához rögzítjük.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei.

Műtét alatt hasi szerv (húgyhólyag, erek) sérülése, melynek ellátása azonnal, még a műtét alatt megtörténik.

Műtét alatti vérzés miatt vérkészítmény adására kényszerülhetünk. A rétegesen zárt hasfalban szükség esetén vékony csövet hagyunk vissza a felgyülemelő váladék utólagos levezetésére. Előfordulhat fertőzés, sebgyógyulás, sebészérválás, vérömleny, vérszegénység, tartósabb ágyhoz kötöttség esetén tüdőgyulladás, vérrögösödés. Tipikus műtét utáni szövődmény az átmeneti vizeletürítési nehézség.

Műtét utáni történések:

A műtét után visszakerül kórtermébe. Hólyag katéterét 2 napig fenn hagyjuk, a folyadékot állandó vénatűn keresztül pótoljuk. Műtét után láz léphet fel. Panaszmentesség esetén 3 nap múlva otthonába bocsátjuk.

Várható következmények:

A panaszok visszatérhetnek.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Fiatalabb korban hüvelyi torna, idősebb korban gyűrű felhelyezés, gyógyszeres kezelés, mellső hüvelyfali plasztikai vagy TVT műtét. Ezek helyett azért választjuk a has megnyitásával járó Burch műtétet, mert az urodinamiás vizsgálat lelete és javallata alapján Önnél ezt tartjuk a leghatékonyabb eljárásnak.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtét után 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal. Addig kímélő életmód, nemi élet tilalom javasolt.

A műtét elmaradásának következményei:

Fennálló panaszai tovább fokozódhatnak, további egészségromlás következhet be.