

A beavatkozás jellege:

Hüvelyi diagnosztikus és terápiás jellegű beavatkozás. Akkor végezzük, ha a hasüreg legmélyebb részét: a Douglas üreget gennyes izzadmány tölti ki (Douglas-tályog).

A beavatkozás célja:

A hüvelyfalon keresztül a hasüreget megnyitjuk, és abban lévő folyadékot (gennyet) lebocsátjuk.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a hüvelyt fertőtlenítjük, a méhszájat kifogjuk, és a hüvelyboltozaton keresztül a hasüreg legmélyebb részét: a Douglas üreget megnyitjuk. A lebocsátott gennyet mikrobiológiai feldolgozásra küldjük. A sebbe a további váladék levezetése céljából gumicsövet helyezünk.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei.

A hasüregi szervek sérülése esetén hastükrözés, esetleg hasmetszés válhat szükségessé. A műtét utáni napokon vérzés léphet fel.

Műtét utáni történések:

A beteg állapotától függően néhány nap után távozhat az osztályról. Műtét után enyhe alhasi görcsök, kevés vérzés néhány napig lehetséges, antibiotikus kezelés gyakran szükséges.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Jelenleg nincs ilyen.

A műtét elmaradásának következményei:

Panaszainak fokozódása, a gyulladás hasüregen belüli továbbterjedése, esetleg az életet is veszélyeztető hashártyagyulladás és vérmérgezés.