

A beavatkozás jellege:

Hüvelyi diagnosztikus és terápiás jellegű beavatkozás.

A beavatkozás célja:

Diagnosztikus esetben szövetminta nyérése a méhnyak és a méhtest nyálkahártyájáról. Terápiás esetben polip eltávolítása, visszamaradt szövet eltávolítása előzetes műtét (pl. abortusz, spontán vetélés) után, vérzés megszüntetése.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a hüvelyt fertőtlenítjük, a méhszájat kifogjuk, szondavizsgálat után a méhnyakat feltágítjuk, majd küretkanállal eltávolítjuk a méhnyak és a méhtest nyálkahártyáját. A kapott mintákat szövettani feldolgozásra küldjük.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei.

A méh sérülése (perforáció) esetén hastükrözés, esetleg hasmetszés válhat szükségessé. A műtét utáni napokon vérzés, gyulladás léphet fel.

Műtét utáni történések:

A beteg néhány órás megfigyelés után még aznap távozik az osztályról. Műtét után enyhe alhasi görcsök, kevés vérzés néhány napig lehetséges, láz, gyulladás esetén antibiotikus kezelés válhat szükségessé.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Jelenleg nincs ilyen.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Pár napig kímélő életmód, a további kezelés a szövettani lelettől függ. Szövettani leletéért 4 hét múlva jelentkezzen, kontroll vizsgálat javasolt 4-6 hét múlva.

A műtét elmaradásának következményei:

Panaszainak fokozódása, rosszindulatú elfajulás, vagy a már meglévő rosszindulatú daganat gyógykezelésének elmaradása miatti végzetessé fajulása.