

A beavatkozás jellege:

Hüvelyi diagnosztikus és terápiás jellegű beavatkozás.

A beavatkozás célja:

A méhszájon észlelt kolposzkópos és citológiai rákmegelőző állapotra utaló elváltozás esetén végzett műtét a pontos szövettani diagnózis felállítása érdekében.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a hüvelyt fertőtlenítjük, a méhszájat kifogjuk, mindkét oldalon aláöltjük a méhnyakat ellátó ütőeret. A metszést az ép hámban vezetve a méhnyakból kúp alakú szövetdarabot távolítunk el. Szondavizsgálat után a méhnyakat feltágítjuk, majd küretkanállal eltávolítjuk a méhnyak és a méhtest nyálkahártyáját. A kapott mintákat szövettani feldolgozásra küldjük. A sebszéleket varratokkal egyesítjük, esetenként a nyakcsatornába gumicsövet helyezünk.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. A méh sérülése (perforáció) esetén hastükrözés, esetleg hasmetszés válhat szükségessé. A műtét utáni napokon vérzés, később a nyakcsatorna külső nyílásának szűkülete léphet fel.

Műtét utáni történések:

A beteg 2-3 nap múlva távozzhat az osztályról. Műtét után enyhe alhasi görcsök, kevés vérzés néhány napig lehetséges. Ha az elváltozást nem sikerül az épben eltávolítani, újabb műtét válhat szükségessé.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Jelenleg nincs ilyen.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtét után kímélő életmód, nemi élet mellőzése javasolt, a további kezelés a szövettani lelettől függ, melyért 4 hét múlva jelentkezzen. Kontroll vizsgálat javasolt 4 hét múlva.

A műtét elmaradásának következményei:

Panaszainak fokozódása, rosszindulatú elfajulás, vagy a már meglévő rosszindulatú daganat végzetessé fajulása.