

A beavatkozás jellege:

Hüvelyi diagnosztikus beavatkozás.

A beavatkozás célja:

Ezzel a beavatkozással legtöbbször meddőségi kivizsgálás kapcsán a méh üregéről és a petevezetők átjárhatóságáról kapunk képet.

Hogyan történik a beavatkozás?

A ciklus első felében, a menstruáció után végezzük. A hüvelyt fertőtlenítjük és a nyakcsatornába vezetett eszközzel keresztül kontrasztanyagot fecskendezünk a méhbe és röntgen átvilágítás mellett követjük az anyag útját.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Kontrasztanyag iránti érzékenység, vérzés, később antibiotikum kezelést igénylő gyulladás.

Műtét utáni történések:

A beteg néhány órás megfigyelés után még aznap távozhat az osztályról.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Méh- és hastükrözés, de ezek altatással és nagyobb megterheléssel járnak. Speciális kontrasztanyaggal ultrahangos vizsgálattal, ez azonban pontatlanabb.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Kontroll vizsgálat javasolt 4 hét múlva, panasz esetén azonnal.

A műtét elmaradásának következményei:

Meddőségi kivizsgálás kapcsán elengedhetetlen a petevezetők átjárhatóságának vizsgálata.