

### **A beavatkozás jellege:**

Hüvelyi diagnosztikus és terápiás jellegű beavatkozás.

### **A beavatkozás célja:**

A méhszájon észlelt kolposzkópos és citológiai rákmegelőző állapotra utaló vagy panaszt okozó jóindulatú elváltozás esetén végzett műtét.

### **Hogyan történik a beavatkozás?**

Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a hüvelyt fertőtlenítjük, a méhszájat kifogjuk. A metszést az ép hámban vezetve a méhnyakból hámját rádiófrekvenciás hurokkal eltávolítjuk. Ha kürettázás is szükséges, szondavizsgálat után a méhnyakat feltágítjuk, majd küretkanállal eltávolítjuk a méhnyak és a méhtest nyálkahártyáját. A kapott mintákat szövettani feldolgozásra küldjük. A műtéti terület vérzését csillapítjuk.

### **Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?**

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei.

A méh sérülése (perforáció) esetén hastükrözés, esetleg hasmetszés válhat szükségessé. A műtét utáni napokon vérzés, később a nyakcsatorna külső nyílásának szűkülete léphet fel.

### **Műtét utáni történések:**

A beteg másnap távozik az osztályról. Műtét után enyhe alhasi görcsök, kevés vérzés néhány napig, folyás pár hétig lehetséges.

### **Milyen alternatív megoldás lehetséges?**

A méhszáj jóindulatú elváltozásának konzervatív kezelése, ez hosszadalmas, gyakran kiújul és nem végleges. Fagyasztásos, ill. lézeres sebészeti eljárások is végezhetők.

### **Mi a teendő a beavatkozás után?**

Műtét után kímélő életmód, nemi élet mellőzése javasolt, a további kezelés a szövettani lelettől függ, ezért 4 hét múlva kérjük vissza; kontroll vizsgálat javasolt 4-5 hét múlva.

### **A műtét elmaradásának következményei:**

Panaszainak fokozódása, rosszindulatú elfajulás.

