

A beavatkozás jellege:

Hüvelyi diagnosztikus és terápiás jellegű beavatkozás.

A beavatkozás célja:

A méhszájon észlelt kolposzkópos és citológiai rákmegelőző állapotra utaló, vagy panaszt okozó jóindulatú elváltozás esetén végzett műtét akkor, ha a méhszáj szülési sérülésből visszamaradó anatómiai deformitása is fennáll.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a hüvelyt fertőtlenítjük, a méhszájat kifogjuk. Mindkét oldalon aláöltjük a méhnyakat ellátó ütőeret. A metszést az ép hámban vezetve a méhszájat eltávolítjuk. Ha kürettázs is szükséges, szondavizsgálat után a méhnyakat feltágítjuk, majd küretkanállal eltávolítjuk a méhnyak és a méhtest nyálkahártyáját. A kapott mintákat szövettani feldolgozásra küldjük. A sebszéleket varratokkal egyesítjük, esetenként gumicsövet hagyunk vissza.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. A méh sérülése (perforáció) esetén hastükrözés, esetleg hasmetszés válhat szükségessé. A műtét utáni napokon vérzés, később a nyakcsatorna külső nyílásának szűkülete léphet fel.

Műtét utáni történések:

A beteg 2-3 nap múlva távozhat az osztályról. Műtét után enyhe alhasi görcsök, folyás, kevés vérzés néhány napig lehetséges.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Nincs ilyen.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtét után kímélő életmód, nemi élet mellőzése javasolt, a további kezelés a szövettani lelettől függ, kontroll vizsgálat javasolt 4-5 hét múlva.

A műtét elmaradásának következményei:

Panaszainak fokozódása, rosszindulatú elfajulás.