

### **A beavatkozás jellege:**

A hüvelyfalak süllyedése, hólyag- és bélsérv, közösülési problémák, ill. vizelettartási zavarok miatt végzett hüvelyi terápia jellegű beavatkozás.

### **A beavatkozás célja:**

A hüvelyfalak közel eredeti helyzetének visszaállítása, a vizelettartási problémák megoldása.

### **Hogyan történik a beavatkozás?**

Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a hüvelyt fertőtlenítjük. A műtét során a mellső, ill. hátsó hüvelyfalat szűkítjük.

### **Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?**

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Műtét alatt hólyag- vagy végbélsérülés, utóvérzés, vérömleny, vérzés húgyhólyagból, sipolyképződés, sebszétválás, vizeletürítési zavarok.

### **Műtét utáni történések:**

Kisfokú vérzés lehetséges, a hólyag katétert 48 óra múlva távolítjuk el. A beteg 3-4 nap múlva távozhat osztályunkról.

### **Várható következmények:**

Panaszai az évek során kiújulhatnak.

### **Milyen alternatív megoldás lehetséges?**

Fiatalabb korban hüvelyi torna, idősebb korban gyűrű felhelyezés, gyógyszeres kezelés, de ezek egyike sem éri el a műtéti kezelés hatékonyságát. A vizelettartási problémák megoldására egyéb (pl. szalag-plasztikai) műtétek végezhetők.

### **Mi a teendő a beavatkozás után?**

Műtét után kímélő életmód, nemi élet mellőzése javasolt, kontroll vizsgálat javasolt 6 hét múlva, panasz esetén azonnal.

### **A műtét elmaradásának következményei:**

Panaszainak fokozódása, a hüvely teljes kifordulása a méhhez együtt.