

A beavatkozás jellege:

Befejezetlen (inkomplett abortusz), vagy abbamaradt (missed abortusz) esetén végzett hüvelyi terápiás jellegű beavatkozás.

A beavatkozás célja:

A méh kiürítése a vetélés befejezése, és az esetleg életet is veszélyeztető mennyiségű vérzés megszüntetése céljából.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a hüvelyt fertőtlenítjük, a méhszájat kifogjuk, szondavizsgálat után a méhnyakat, ha ez szükséges, feltágítjuk, majd szívóval vagy küretkanállal eltávolítjuk a méh tartalmát. Abbamaradt vetélés esetén nem szült nőknél a méhszáj ún. lamináriás előtágítását végezzük.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. A méh sérülése (perforáció) esetén hastükrözés, esetleg hasmetszés és a méh eltávolítása válhat szükségessé. Vérzés, gyulladás, visszér-rögösödés (trombózis) léphet fel

Műtét utáni történések:

Műtét után enyhe alhasi görcsök, kevés vérzés néhány napig lehetséges, láz, gyulladás esetén antibiotikus kezelés válhat szükségessé. A beteg a műtét utáni napon az osztályról távozik.

Várható következmények:

A petevezető gyulladás okozta elzáródása meddőséget okozhat. Gyakoribbá válhat a vetélési és koraszülési hajlam. Ezek természetesen nem a műtét, hanem a vetélés következményei.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Jelenleg nincs ilyen.

Mi a teendő a beavatkozás után?

4 hétig kímélő életmód, nemi élet tilalom, a szövettani leletért 4 hét múlva kérjük vissza, kontroll vizsgálat javasolt 4-5 hét múlva.

A műtét elmaradásának következményei:

Vérzés és lázas állapot, különböző súlyossági fokban, ami a beteg életét is veszélyeztetheti.