

### **A beavatkozás jellege:**

Diagnosztikus nőgyógyászati beavatkozás.

### **A beavatkozás célja:**

A szeméremtesten észlelhető kóros elváltozás szövettani tisztázása.

### **Hogyan történik a beavatkozás?**

Az altatóorvos által kiválasztott vagy helyi érzéstelenítésben a szeméremtestet fertőtlenítjük, majd az észlelt elváltozást lehetőleg az épben eltávolítjuk kaccsal vagy szikével. Szükség szerint a sebszéleket varratokkal egyesítjük. A kapott mintákat szövettani feldolgozásra küldjük.

### **Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?**

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei.

### **Műtét utáni történések:**

A beteg néhány órás megfigyelés után még aznap távozik az osztályról. Műtét után enyhe fájdalom, kevés vérzés néhány napig lehetséges.

### **Milyen alternatív megoldás lehetséges?**

Jelenleg nincs ilyen.

### **Mi a teendő a beavatkozás után?**

Varratszedés 5-6 nap múlva. Négy hétig kímélő életmód, nemi élet tilalom, a további kezelés a szövettani lelettől függ, ezért 4 hét múlva kérjük vissza. Kontroll vizsgálat javasolt 4 hét múlva.

### **A műtét elmaradásának következményei:**

A pontos diagnózis akadályba ütközhet és a megfelelő kezelés elmaradhat, rosszindulatú daganat alakulhat ki.